

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Publication périodique de la Circonscription PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, CORSE

- MINISTERE DE L'AGRICULTURE -

- SERVICE de la PROTECTION des VEGETAUX -

STATION D'AVERTISSEMENTS : Ancienne Conserverie de CASAMOZZA, LUCCIANA 20290 - BORGO

Abonnement annuel : 65 Fr. à Régisseur recettes D.D.A. VAUCLUSE - MARSEILLE 9660 74 V

Edition Speciale Corse

BULLETIN N° 14

DU 1er AOUT 1983.



V I G N E

=====

L'augmentation des températures, durant ces derniers jours s'est traduit, dans certains secteurs, par des décolorations de feuilles ainsi que des dessèchements de portions de grappes.

Ces phénomènes localisés sont dus à la chaleur et affectent surtout les grappes à grains serrés.

. Cicadelles de la FLAVESCENCE DOREE

Le 2eme traitement par voie aérienne s'est déroulé dans la semaine du 25 au 29 Juillet, dans la région de PATRIMONIO, St FLORENT. Le produit employé était à base de Cyperméthrine.

En MARANA et CASINCA, un traitement contre cette Cicadelle doit être renouvelé 15 jours après le dernier insecticide, car on observe encore de nouvelles éclosions de jeunes larves.

. Tordeuses de la grappe

Le vol de 3eme génération n'a pas encore débuté.

. Acarieus

De nombreuses populations sont observées actuellement. On trouve à la fois des adultes, des oeufs et des larves. Intervenir si 30 % des feuilles sont occupées, avec des produits acaricides spécifiques (dose de matière active par hl):

Azocyclotin	30 g/hl	PEROPAL	30 jours avant la récolte
Benzoximate	30 g/hl	ARTABAN	15 jours " "
Bromopopylate	50 g/hl	NEORON	15 jours " "
Chlorofenizon	30 g/hl	nombreuses spécialités	7 jours " "
Cyhexatin	30 g/hl	" "	30 jours " "
Cyhexatin + Tetradifon	0,15 l/hl	" "	30 jours " "
Dicofol	50 g/hl	" "	15 jours " "
Dicofol + Diethion	0,20 l/hl	ACAFOR	15 jours " "
Dicofol + Tetradifon	0,20 l/hl	KELTHION	15 jours " "

Fenizon	50 g/hl	nombreuses spécialités	7 jours avant récolte
Fenbutatin-Oxyde	50 g/hl	TORQUE	7 jours " "
Fenpropathrin	100 g/hl	DANITOL	21 jours " "
Propargite	60 g/hl	OMITE	21 jours " "

. Mildiou

On observe, ça et là, des taches de Mildiou, le plus souvent en voie de dessèchement. Toutefois, afin de protéger les feuilles contre un Mildiou tardif, un traitement de début véraison est à réaliser avec une bouillie bordelaise ou association. La protection des feuilles permettra une meilleure maturation des raisins et un bon aoutement du bois.

O L I V I E R

. Mouche de l'Olive

Le vol s'intensifie. Dans le cas de lutte par appâts - pulvérisation ; maintenir le rythme d'un traitement tous les 10 à 15 jours, suivant le nombre de captures. En pulvérisation classique, intervenir dès maintenant : (dose de matière active par hl).

Deltaméthrine	1,15 g	Fenthion	50 g
Diazinon	30 g	Formothion	40 g
Diméthoate	30 g	Phosphamidon	30 g

ARBRES FRUITIERS

. Acarie

De nombreux acarie sont visibles actuellement. Intervenir dès maintenant sur pêchers et pommiers.

. Oïdium

Les attaques sont toujours fréquentes en vergers de pommiers et pêchers. Il est indispensable de maintenir la protection. On peut intervenir avec les matières actives suivantes : (dose de M.A. en g/hl).

Benomyl	30	Pommier
Binapacryl	50	
Bupirimate	15	Pommier, pêcher, abricotier
Chinométhionate	7,5	
Dinocap	25	Abricotier, pêcher, pommier
Ditalimphos	40	Pommier
Fénarimol	4	Pommier, pêcher, abricotier
Méthylthiophanate	70	
Pirazophos	30	Abricotier, pêcher, pommier
Soufre micronisé 600 de S max		" " "
Soufre trituré, ventilé sublimé		: en poudrage
Triforine	33,3	Pêcher, abricotier, pommier
Triadiméfon	5	Pommier

ASSOCIATIONS Nitotal isopropyl + Soufre mouillable Pommier

. Tordeuse orientale du pêcher : le vol est important.

Intervenir dès à présent sur les variétés de pêches ou de prunes tardives. (dose de matière active par hl)

Azinphos éthyl et méthyl	40 g	Carbaryl	120 g
Deltaméthrine	1,75 g	Dichlorvos	125 g
Fénitrothion	50 g	Méthidathion	40 g
Méthomyl	62,50 g	Mévinphos	50 g
Oléoparathion	20 g + huile	Phosalone	60 g
Parathion éthyl et méthyl	25 g		